

กิ้งกือเหลืองเท้าส้ม

Thyropygus bispinispatula Pimvichai, Enghoff & Panha, 2009

เป็นกิ้งกือกระบอกที่มีจำนวนปล้องประมาณ 64-67 ปล้อง ความยาวลำตัวประมาณ 12-15 ซม. ความกว้างของลำตัวประมาณ 0.7-1 ซม. ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ขามีสีน้ำตาลส้ม ปล้องสุดท้ายมีสีน้ำตาลเข้มและมีหนามแหลมยื่นออกมา โคนขึ้นด้านบน มีร่องข้างลำตัวยาว ในเพศผู้พบลักษณะของแผ่นตีนตุ๊กแก ที่อ่อนนุ่มสีขาว พบที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร



กิ้งกือเหลืองเท้าส้ม

กิ้งกือเหลืองเท้าชมพู

Thyropygus bearti Pimvichai, Enghoff & Panha, 2009

เป็นกิ้งกือกระบอกขนาดใหญ่ มีจำนวนปล้องประมาณ 61-65 ปล้อง ความยาวลำตัวประมาณ 12-13 ซม. ความกว้างของลำตัวประมาณ 0.7-0.8 ซม. ลำตัวมีสีน้ำตาล ขาและหนวดมีสีชมพู ปล้องสุดท้ายมีหนามแหลมยื่นออกมา โคนขึ้นด้านบน มีร่องข้างลำตัวยาว ในเพศผู้พบลักษณะของแผ่นตีนตุ๊กแกที่อ่อนนุ่มสีขาว พบที่อำเภอตอนสัก สุราษฎร์ธานี



กิ้งกือเหลืองเท้าชมพู

อ้างอิง : Pimvichai, P., H. Enghoff, and S. Panha. 2009. A revision of the *Thyropygus allevatus* group. Part 1: the *T. opinatus* subgroup (Diplopoda: Spirostreptida: Harpagophoridae). *Zootaxa* 2016:17-50.

ข้อมูล/ภาพ: ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และ นางสาวปิยะธิดา พิมพ์วิชัย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย